

## MAT349 Kombinatoriikka, kevät 2001

Harjoitus 12, 11.4.

1. Määritä raja-arvo  $\lim_{q \rightarrow 1} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}_q$ .
2. Todista, että on olemassa kertaluvun  $n$  projektiivinen taso (so.  $S(2, n+1, n^2 + n + 1)$ -tyyppinen asetelma), jos ja vain jos on olemassa kertaluvun  $n$  affiini taso (so.  $S(2, n, n^2)$ -tyyppinen asetelma).
3. Konstruoi kolmen pareittain ortogonaalisen  $4 \times 4$ -latinalaisen neliön muodostama MOLS, ja tämän perusteella kertaluvun 4 affiini taso  $AG(2, 4) \equiv S(2, 4, 16)$ .
4. Osoita, että jos  $D$  on  $2 - (v, k, \lambda)$ -asetelma, niin joukkoperhe  $D'$ , joka sisältää täsmälleen  $D$ :n lohkojen komplementit, on  $t - (v, v - k, \mu)$ -asetelma eräillä  $t, \mu$ . Määritä parametrien  $t, \mu$  arvot. Muodosta Fanon tason  $PG(2, 2) \equiv STS(7)$  komplementtiasetelma.
5. 2-asetelmaa, jossa on Fisherin epäyhtälön mukainen minimimäärä lohkoja,  $b = v$ , sanotaan *symmetriseksi*. Esimerkiksi projektiiviset tasot ovat symmetrisiä asetelmia. Symmetrisen  $2 - (v, k, \lambda)$ -asetelman  $D$  insidenssimatriisi on neliömatriisi, ja sen transpoosi kuvaa  $D$ :n *duaaliasetelman*  $D^*$ . Määritä asetelman  $D^*$  tyyppi, ja muodosta Fanon tason duaaliasetelma.
6. Osoita, että ei voi olla olemassa  $2 - (25, 10, 3)$ -tyyppistä asetelmaa.
7. Olkoon  $\lambda \geq 1$  ja  $2 \leq k < v$ . Joukko  $D \subseteq \mathbf{Z}_v$ ,  $|D| = k$ , on  $(v, k, \lambda)$ -erotusjoukko, jos jokainen  $a \in \mathbf{Z}_v \setminus \{0\}$  voidaan esittää kahden alkion  $d_i, d_j \in D$  erotuksena  $a = d_i - d_j \pmod{v}$  täsmälleen  $\lambda$  tavalla. Osoita, että jos  $D$  on  $(v, k, \lambda)$ -erotusjoukko, niin  $D$ :n translaatit

$$D + a = \{d + a \mid d \in D\}, \quad a \in \mathbf{Z}_v$$

muodostavat symmetrisen  $2 - (v, k, \lambda)$ -asetelman. Totea, että joukko  $\{1, 2, 4\}$  on  $(7, 3, 1)$ -erotusjoukko ja muodosta vastaava asetelma.